

## BEMESTINGSSCHEMA

Plantensoort		Maanden												Frequentie
Latijnse naam	Nederlandse naam	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	
<b>Loofbomen</b>														
Acer	Esdoorn													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Azalea	Azalea-Rhododendron													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Carpinus	Haagbeuk													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Cotoneaster	Dwergmispel													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Crataegus	Meidoorn													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Fagus	Beuk													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Ginkgo	Ginkgo													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Malus	Appel													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Potentilla	Ganzerik													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Quercus	Eik													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Zelkova	Zelkova													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
<b>Coniferen</b>														
Chameacyparis	Cipres													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Juniperus	Jeneverbes													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Taxus	Venijnboom													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
<b>Naaldbomen</b>														
Larix	Lork													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Pinus	Den													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken
Picea	Spar													Vloeibaar: 1x per 2 weken Vast: 1x per 4 - 8 weken

- Standaard bemestingsperiode
- Extra bemestingsperiode (afhankelijk van weersomstandigheden)

- Alleen gezonde bomen bemesten!
- Bemesten bij nachttemperatuur >10°C en dagtemperatuur <25°C
- Hoeveelheid en soort mest afhankelijk van boomsoort, grootte plant / schaal
- Grond voor of na bemesten nat maken zodat vaste meststoffen kunnen worden opgenomen